


Mavrik®



Taimekaitsevahend

Insektitsiid

Mavrik® väikepakendis kasutatakse kahjurite tõrjeks hernel, oal, kartulil, porgandil, lillkapsal, brokkolil, peakapsal, rooskapsal ja ilutaimedel.

Toimeaine: tau-fluvalinaat 240 g/l

Preparaadi vorm: emulsioon, õli vees (EW)

Pakend: 5 ml

Eesti reg-nr: 0065/22.12.04

Partii nr ja valmistamise kuupäev: vaata pakendilt

Taimekaitsevahendit **Mavrik®** 5 ml, 10 ml ja 30 ml pakendites tohib osta ja kasutada ka taimekaitsetunnistust mitteomav isik.

Sisaldab ohtlikke aineid tau-fluvalinaat ja 1,2-etaandiool.

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. **EUH401** Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. **P102** Hoida lastele kättesaamatus kohas. **P391** Mahavoolanud toode kokku koguda. **P501** Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele. **SP1** Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide). **SPe3** Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhervööndist 10 m pinnaveekogudest hernel, oal ja kartulil kasutamisel. Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhervööndist 20 m pinnaveekogudest porgandil ja kapsastel kasutamisel. Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhervööndist 30 m pinnaveekogudest ilutaimedel kasutamisel.

Toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid muid kasutuspiiranguid.

ESMAABI

Õnnetusjuhtumi puhul konsulteerida arstiga. Säilitada arsti jaoks originaaletikett. Ravi sümptomaatiline. Spetsiaalne vastumürk puudub.

Preparaadi nahale sattudes võtta ära määratud riided, saastunud kehaosad pesta põhjalikult vee ja seebiga. Kui naha ärritus püsib, konsulteerida arstiga.

Silma sattumisel pesta otsekohe 15 min jooksul voolava veega, püüdes hoida silmalaud avatuna. Konsulteerida silma- või üldarstiga.

Sissehingamisel väljuda ohtlikust tsoonist.

Allaneelamisel peab oksendamise esilekutsumiseks kannatanu olema pea-allapoole asendis. Anda kiiresti juua 1-2 klaasi vett ja oksendamise esilekutsumiseks ärritada sõrmega kurgunibu. Pöörduda arsti poole. Teadvuse kaotuse korral hoida kannatanu küljeli asendis, pea allapoole, mitte manustada midagi suu kaudu ega kutsuda esile oksendamist.

KESKKONNAOHTLIKKUS

Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ja taara loputusvee sattumist pinna- ja põhjavette ning kanalisatsiooni!

HOIUSTAMINE

Preparaati tuleb säilitada originaalpakendis, varustatuna etiketiga, hästi suletuna, jahedas, kuivas, ventileeritavas ja lukustatud kohas.

TAARA PURUNEMISEL

Mahavoolanud preparaat katta saepuru, liiva või muu absorbeeriva ainega kuni segu on täielikult läbi imunud. Segu koguda spetsiaalse markeeritud anumasse ja viia ohtlike jäätmete käitlejale.

TAARA KAHJUTUSTAMINE

Tühja taarat uuesti mitte kasutada! Kasutatud taara pesta kolm korda puhta veega, loputusveed lisada töölahusesse. Taara muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

ETTEVAATUSABINÕUD

Vältida kokkupuudet preparaadiga. Võimaluse korral kasutada vastavat kaitseriietust, kummikindaid ja -saapaid, kaitseprille, hingamisteede kaitsevahendit.

Pärast töö lõpetamist pesta käed ja nägu. Kasutatud kaitseriietus pesta enne järgmist kasutamist.

ÜLDINE TEAVE

Mavrik® hävitab kahjurputukaid ning tõrjub ja hävitab lestasid. Preparaat mõjub eelkõige kontaktel teel, s.t. et tõrjutavad kahjurid peavad kokku puutuma pritsimisvedelikuga või selle jääkidega. Hea tulemuse eelduseks on taime korralik katmine pritsimisvedelikuga. **Mavrik®** on lubatud kasutada taimede õitsemise ajal. Pritsitakse hommiku- ja õhtutundidel, kui mesilaste ja teiste kasulike putukate lendlus pole alanud või on lõppenud.

KASUTAMINE

Pritsida kahjurite ilmutumisel

Kultuur	Töö-lahus: Mavrik Vita ml/10 l vee kohta	Kahjurid	Ooteaeg (päevi)	Pritsimis- kordade arv	Pritsimisfaas
Roheline hernes kaunaga ja kaunata	6	Hernekärsakad (<i>Sitona sp.</i>), herneripslane (<i>Kakothrips pisivorus</i>), herne-lehetäi (<i>Acyrtosiphon pisum</i>), hernemähkur (<i>Cydia nigricana</i>)	7	1-2	Kumerdunud iduvars koos pärislehtedega väljub mullast ja sirutub üles, lehed muutuvad rohelisteks kuni kõik kaunad peavarrel on normaalsuuruses, seemned on rohelised, esimestes kauntes muutuvad tahkeks
Hernes (täisküpsuses koristatav)	6	Hernekärsakad (<i>Sitona sp.</i>), herneripslane (<i>Kakothrips pisivorus</i>), herne-lehetäi (<i>Acyrtosiphon pisum</i>), hernemähkur (<i>Cydia nigricana</i>)	14	1-2	Kumerdunud iduvars koos pärislehtedega väljub mullast ja sirutub ülesse, lehed muutuvad rohelisteks kuni kõik kaunad peavarrel on normaalsuuruses, seemned on rohelised, esimestes kauntes muutuvad tahkeks
Oad (täisküpsuses koristatavad)	6	Oa-lehetäi (<i>Aphis fabae</i>)	14	1-2	Õiepungad on nähtaval, kuid kaetud veel lehtedega kuni peaaegu kõik kaunad on saavutanud oma lõpliku pikkuse
Kartul	6	Kartulimardikas (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), lehetäid (Aphids), lehetirtlased (<i>Empoasca vitis</i> , <i>Empoasca solani</i> , <i>Eupteryx atrapunctata</i>)	7	1-2	Peavarre 2. leht on lahti keerdunud (> 4 cm) kuni 95% mugulatest on koore moodustumine lõppenud ja apikaalses otsas ka kinnistunud

Kultuur	Töö-lahus: Mavrik Vita ml/10 l vee kohta	Kahjurid	Ooteaeg (päevi)	Pritsimis-kordade arv	Pritsimisfaas
Porgand	8	Porgandi-lehekirp (<i>Trioza apicalis</i>), porgandikärbes (<i>Psila rosae</i>)	14	1-2	Kolmas pärisleht on lahti voltinud kuni 10 või enam pärislehte on lahti voltinud
Lillkapsas, brokkoli, peakapsas ja rooskapsas	8	Suur kapsaliblikas (<i>Pieris brassicae</i>), väike kapsaliblikas (<i>P. napi</i>), kapsakoi (<i>Plutella xylostella</i>), kapsakärbes (<i>Delia sp.</i>), maakirbud (<i>Phyllotreta sp.</i>), naeri-hiilamardikas (<i>Meligethes aeneus</i>), kapsa tuhtkät (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	7	1	Idulehed on täielikult lahti volditud; kasvukuhik või esimene leht on nähtav kuni pea on omandanud tüüpilise suuruse ja kuju, pea on tihedalt koos
Ilutaimed	6	Lehetäid, lestad, lehekirbud (<i>Psyllidae</i>), mardikalised (<i>Coleoptera</i>)	-	1-2	

10 l töölahusega saab pritsida 330 m² (300 l töölahust/ha).

Pritsimiste vaheline intervall on 14 päeva.

KASUTUSVIIS

Pritsimiseks võib kasutada erinevat pritsimisvarustust.

10 l töölahusega saab pritsida 330 m² (300 l/ha).

Vajaliku koguse töölahusega peab töödeldava pinna katma võimalikult ühtlaselt.

TÖÖLAHUSE VALMISTAMINE

Enne pritsipaagis töölahuse valmistamist testida pritsimisseadet veega, et mõõta töölahuse kasutust 100 m² kohta. Vastavalt sellele on võimalik teha parandusi liikumise kiiruse kohta pritsimise ajal.

10 l töölahust on piisav 330 m² töötlemiseks (300 l/ha). Kui pritsitav ala on väiksem kui 330 m², on vaja teha ümberarvestus.

Näiteks, kui pritsitav ala on 100 m², siis võta 3 l vett ja lisa:

- 1,8 ml **Mavrik**[®]-t, kui doos on 6 ml / 10 l vee kohta;

- 2,4 ml **Mavrik**[®]-t, kui doos on 8 ml / 10 l vee kohta.

Täitke pritsipaak poole võrra veega, seejärel lisage vajalik kogus **Mavrik**[®]-t.

Pärast seda lisage ülejäänud veekogus.

Iga kord pärast pritsimist tuleb prits puhastada hoolikalt veega ning

loputusvesi pritsida eelnevalt pritsitud alale.

Märke!

Maksimaalne pritsimiseks lubatud piirkond päevas on 1000 m². Pritsida tuule kiirusega kuni 3 m/s.

Selleks, et vältida pritsimise negatiivset mõju koduloomade ja inimeste tervisele, ei ole lubatud pritsimisega mitteseotud isikutel ning koduloomadel olla alal, kus pritsimine toimub.

Kultuuride kahjustuste ärahoidmiseks pritsida võimalikult vara, hiljemalt esimeste kahjustuste ilmunisel. Pritsimistulemus on nähtav 4 päeva pärast töötlemist. Vajaduse korral pritsimist korrata 2-3 nädalase intervalliga.

Lillkapsa, brokkoli, peakapsa ja rooskapsa puhul pole teist korda pritsida lubatud.

Kahjuritõrje optimaalsed tingimused

Optimaalsed tulemused saadakse siis, kui:

- kahjurputukad on aktiivsed ja puutuvad kokku pritsitava vedelikuga;
- kahjurputukad on tundlikus kasvustaadiumis.

Toode on vihmakindel 2 tundi peale pritsimist.

Kui optimaalsed tingimused ei ole täidetud, võib mõju halveneda. Sellistes tingimustes ei tohi doosi vähendada.

PAAGISEGUD

Mavrik[®]-t võib segada paljude agrokeemiliste toodetega, v.a. leeliselised pritsimisvedelikud. Kuna on võimatu teada kõiki müügil olevaid preparaate, siis tootja ei saa vastutada segatud pritsimisvedelike eest, mis ei ole soovitatud nende spetsialistide poolt.

Mavrik-t mitte segada kokku rohkem kui ühe muu tootega.

Mavrik-t lisada paagisegusse esimese komponendina.

TÜHJADE PAKENDITE HÄVITAMINE

Taara korduvkasutamine on keelatud. Loputage tühja pakendit 3 korda puhta veega, loputusvesi valage pritsipaaki valmistatava töölahuse hulka. Tühi taara viia ohtlikesse jäätmetesse. Ärge visake mahuteid kanalisatsiooni- ja drenaazüsteemidesse; ennetage pinna- ja põhjavee saastumist.

HOIUSTAMISNÕUDED

Hoida originaalpakendis, avamata, kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas eraldi toiduainetest ja loomasöödast. Hoida otsese päikesevalguse eest. Hoida temperatuuril vahemikus 0°C kuni +30°C.

Märkus

Tootja vastutab pestitsiidi kvaliteedi eest juhul, kui see on pakitud firma poolt. Tootja firma ei saa vastutada kahjustuste eest, mis on põhjustatud preparaadi säilitamise ja kasutamise instruksioonide mittejärgimisest.

Loa valdaja:

ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
P.O. Box 355,
3830 AK Leusden
Madalmaad

Tootja / pakendaja:

ADAMA Makhteshim Ltd.
P.O.B. 60
Industrial Zone
84100 Beer-Sheva
Iisrael

Pakendaja:

UAB Innovacine Firma MKDS
Piliakalnio t. 68
LT-15175 Nemenčine,
Leedu

Eestisse toimetaja ja turustaja:

Holding Invest OÜ, Tartumaa,
tel.: +372 56294071
www.hi.ee
e-post hi@hi.ee